

— Can —

പിങ്കുരോഗം (ചീക്കുരോഗം)

റബ്ബർ മരങ്ങളെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പിങ്കുരോഗം. ഇത് ചീക്കുരോഗംമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മരങ്ങളുടെ തായ്ത്തടിയിലോ കവരഭാഗത്തോ ശിഖരങ്ങളിലോ ബാധിച്ച മരങ്ങളെ ഭാഗികമായോ ക്രമേണ മുഴുവനായോ ഉണക്കിക്കളയുന്ന രോഗമാണിത്. കുമ്പംബാധമുഖമുണ്ടാകുന്ന ഈ രോഗം ഇന്ത്യയിൽ റബ്ബർമരങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒന്നാണ്. കോർട്ടീസിഡ് സാൽമോണിക്കളർ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കുമ്പം ആണ് രോഗത്തിന് കാരണം. മഴയുടെ കാഠിന്യം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നയിടങ്ങളിലാണ് പിങ്കു രോഗം അധികമായി കാണപ്പെടുന്നത്.

jpg>300Q)3

അൽപം ചരിത്രം

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബീജമരങ്ങൾ മാത്രം കൃഷിചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് തോട്ടത്തിൽ അവിടവിടെയായി ഒറ്റപ്പെട്ട മരങ്ങളിൽ മാത്രമേ പിങ്കുരോഗം കാണപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ബീജമരങ്ങളുടെ ജനിതക വൈവിധ്യമായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം. എന്നാൽ പിൻകാലങ്ങളിൽ ബീജമരങ്ങൾക്കു പകരം ക്ലോണുകൾ കൃഷിചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സ്ഥിതിയാകെ മാറി. ക്ലോണുകൾ മാതൃവൃക്ഷത്തിന്റെ തനിസ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അവയിൽ തികഞ്ഞ ഐക്യരൂപമാണ് കാണാൻ കഴിയുക. രോഗബാധയുടെ കാര്യത്തിലും ഈ ഐക്യരൂപം പ്രകടമാണ്. രോഗവിധേയത്വം കൂടിയ ഒരു മാതൃവൃക്ഷത്തിൽനിന്നു ജന്മമെടുത്ത ക്ലോണിലെ എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും രോഗബാധയുള്ള സാധ്യത കൂടിയ തോതിലുണ്ടാ

യിരിക്കും. രോഗവിധേയത്വം വളരെ കൂടിയ ആർ. ആർ. ഐ. ഐ. 105 പോലുള്ള പുതിയ ക്ലോണുകളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ കൂടുതൽ മരങ്ങളിൽ പിങ്കു (ചീക്ക) രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. വളരെ അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 105 എന്ന ഇനം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ മരങ്ങളിലും രോഗം പിടിപെടുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധ തുലോം കുറവായിരുന്ന ആദ്യകാലങ്ങളിൽ രോഗം വന്നതിനുശേഷം ബോർഡോ കഴമ്പുപുരട്ടി ചികിത്സിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ രോഗനിയന്ത്രണമാർഗ്ഗം തികച്ചും പ്രായോഗികവും ഫലപ്രദവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആർ. ആർ. ഐ. ഐ. 105 പോലുള്ള രോഗവിധേയത്വം കൂടിയ ക്ലോണുകളിൽ ഇന്ന് ഈ മാർഗ്ഗം തികച്ചും അപ്രായോഗികവും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അപര്യാപ്തവുമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. തന്മൂലം കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും ആയാസരഹിതവും ചിലവു കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

നീണ്ടകാലത്തെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് റബ്ബർ മരങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ ബോർഡോ കഴമ്പു പുരട്ടി രോഗാക്രമണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുക എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ മാർഗ്ഗം. രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടശേഷം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിനുപകരം രോഗം വരുമുമ്പേ മരങ്ങളിൽ പ്രതിരോധമരുന്ന് പുരട്ടൽ നടത്തി രോഗബാധയിൽനിന്നു ചെടികളെ രക്ഷിക്കാം.

രോഗാക്രമണത്തിന് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ

തുടർച്ചയായ മഴയും കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷോഷ്ണവും ഉയർന്ന ഈർപ്പവും പിങ്കുരോഗ ബാധയ്ക്ക് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. ഒരിക്കൽ തോട്ടത്തിൽ രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് മാത്രം മഴയുള്ളപ്പോഴും രോഗം പടർന്നുപിടിക്കുകയും മരങ്ങളെ പെട്ടെന്നു കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. മഴ നിശ്ശേഷം അവസാനിക്കുന്ന ഡിസംബർ മാസത്തോടെ മാത്രമേ രോഗം ശമിക്കുകയുള്ളൂ. രോഗകാരിയായ കമീം ആഴത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസംബറോടെ അതിന്റെ വളർച്ച നിലയുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത വർഷം അനുകൂല കാലാവസ്ഥ വന്നെത്തുന്നതോടെ രോഗം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാലം

ചെടികൾക്ക് രണ്ടു വർഷം പ്രായമാകുമ്പോൾ മുതലാണ് പീകരോഗബാധ കണ്ടുവരുന്നത്. രണ്ടുവർഷം മുതൽ പത്തുവർഷം വരെ പ്രായമായ മരങ്ങളിൽ രോഗബാധ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ 2-3 വർഷങ്ങളിലാണ് രോഗബാധ ഏറ്റവും ഗുരുതരം. മഴക്കാലമായ ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് രോഗാക്രമണം സാധാരണയായി കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷണങ്ങളായ കുമ്പുണങ്ങൽ, കുമിളിന്റെ നെക്കേററർ, കോർട്ടി സിയം, എന്നീ അവസ്ഥകൾ കാലവർഷം കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുക. കാലവർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ - നവംബർ മാസങ്ങളിലെ തുലാവർഷം കഴിയുംവരെയും ഈ രോഗം തുടർന്നു കാണാറുണ്ട്. 2 വർഷം പ്രായമായ മരങ്ങളിൽ ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് രോഗം സാധാരണയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളതെങ്കിലും 3 വർഷം പ്രായമായ തോട്ടങ്ങളിൽ തലേ കൊല്ലത്തെ രോഗബാധയുള്ള മരങ്ങളിൽനിന്നു രോഗം പകരുന്നതു മൂലം ജൂണിലോ മെയ് മാസത്തിലോതന്നെ രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം.

രോഗാക്രമണം വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ

കുറുപ്പിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും പീകുരോഗം കണ്ടുവരാറുണ്ടെങ്കിലും RRII - 105, പി.ബി. 217, RRII 600 എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ഈ രോഗബാധ കൂടുതലാണ്.

രോഗലക്ഷണം

തോട്ടത്തിൽ നട്ട് രണ്ടുവർഷമായ പോളിത്തീൻകൂട തൈ മരങ്ങളുടെ തായ്ത്തടിയിലോ പ്രധാന കവരഭാഗത്തോ ശിഖരങ്ങളിലോ ചിലന്തിവലരപോലുള്ള വെളുത്ത പൂപ്പൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് രോഗലക്ഷണം. മഴക്കാലത്തു്, തെളിച്ചമുള്ള ഇടവേളകളിലെ ഈ പൂപ്പൽ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുകയുള്ളു. തണ്ടിന്റെ ഉപരിതലം നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പൂപ്പൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. വളരെവേഗം മുകളിലേയ്ക്കും താഴേയ്ക്കും വളരുന്ന പൂപ്പൽ ചെടിയുടെ പട്ട തുളച്ചു് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ പാൽ പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നു. തണ്ടിന്റെ ചുറ്റോട്ടചുറ്റുമുള്ള പട്ട അഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിയുടെ താഴെനിന്നും പുതിയ മുളകൾ പൊട്ടിത്തുടങ്ങുകയും മുകൾഭാഗം ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അനുകൂലകാലാവസ്ഥയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസംകൊണ്ട് രോഗമുണ്ടായ ഭാഗംമുതൽ മുകളിലേയ്ക്കും മഴവനായി ഉണങ്ങിനശിച്ചേക്കാം. ഉണങ്ങിയ തണ്ടും


പിങ്കു (ചീക്ക്) രോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധ ബോർഡോ കൃഷ്ണപുരസ്തൽ രണ്ടു വർഷം പ്രായമായ ചെടികളിൽ

ശിഖരങ്ങളും അവയിൽ പൊഴിയാതെ നില്ക്കുന്ന ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ ഇലകളും തണ്ടിൽ താഴെനിന്നു വളരെ തുടങ്ങിയ മുളകളും ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ചെറുമാരങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിന്റെ മുകളിൽ പൂർണ്ണ പ്രത്യക്ഷലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നത് സാധാരണയായി സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലായിരിക്കും. പിന്നീട് രോഗബാധയുണ്ടായ ശിഖരങ്ങളുടെ പ്രകാശം തട്ടാത്ത അടിഭാഗങ്ങളിൽ പെയിൻറ് തേച്ചതുപോലെ പീകനിറത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ച കാണാറുണ്ട്. ഇതിനെ കോർട്ടീസിയം സ്റ്ററോയ്ഡ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ വളർച്ചമൂലമാണ് രോഗകാരിയായ കമിളിനു കോർട്ടീസിയം സാൽമോണിക്കുളർ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ഇത്തരം ശിഖരങ്ങളിൽ മുകൾ ഭാഗത്തായി നന്നായി പ്രകാശം തട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഓറഞ്ചുകലർന്ന ചുവപ്പുനിറത്തിലുള്ള ചെറിയ കുരുക്കൾപോലുള്ള വളർച്ച-രേണുക്കൾ നിറഞ്ഞ-യും കാണാം. ഇതിനെ നെക്കേറൻ സ്റ്ററോയ്ഡ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. നെക്കേറൻ വളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന രേണുക്കൾ മറ്റു ചെടികളിൽ പറന്നുപററിയാണ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത്. കമിളിന്റെ നാൽപ്പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പറന്നുപററിയും രോഗബാധയുണ്ടാകാറുണ്ട്.

പുതിയ രോഗപ്രതിരോധ നടപടി

പീകരോഗത്തിനെതിരെ രോഗനിയന്ത്രണമാർഗ്ഗം മാത്രം ശുപാർശചെയ്യുന്ന റെഗർബോർഡ് 1993 മുതൽ ആണ് പ്രതിരോധമാർഗ്ഗംകൂടി ശുപാർശ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയത്. രോഗാക്രമണം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരുന്ന രോഗവിധേയത കൂടിയ ഇനം ക്ലോണുകളിൽ പുതിയ രീതി അവലംബിച്ച് രോഗപ്രതിരോധം സാധിക്കേണ്ടവിധം താഴെച്ചേക്കുന്നു.

തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്ന ജൂൺമാസത്തിൽ മുമ്പായി മെയ് മാസത്തിന്റെ അവസാനദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടുവർഷം പ്രായമായ ചെടികളിൽ പ്രതിരോധ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ ബോർഡോ കഴമ്പു പുരട്ടി നിറുത്തണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുമൂലം തുടർവരുന്ന മഴക്കാലത്ത് പീകരോഗമുലമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാം. ഇത് മൂന്നാം വർഷവും ആവർത്തിക്കണം.



മൂന്നുവർഷം പ്രായമായ ചെടികളിൽ
ബോർഡോ കൂഴമ്പു പുരട്ടേണ്ട വിധം

I രണ്ടു വർഷം പ്രായമായ റബർ ചെടികൾ വളരുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ പീങ്കരോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധ മരുന്ന്പുരട്ടൽ നടത്തേണ്ട രീതി.

1 ശാഖകൾ രൂപപ്പെടുത്ത ചെടികളിൽ

തായ്ത്തണ്ടിൽ തവിട്ടുനിറവും പച്ചനിറവും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ഭാഗത്തായി 30 സെ. മീ. നീളത്തിൽ ചുറ്റോടച്ചുറും ബോർഡോകഴമ്പു നന്നായി പുരട്ടുക (ചിത്രം 1).

2 ശിഖരങ്ങളുള്ള ചെടികളിൽ

ശിഖരങ്ങളുടെ ചുവടുഭാഗമുൾപ്പെടെയുള്ള കവരഭാഗത്തും തായ്ത്തണ്ടിൽ തവിട്ടുനിറവും പച്ചനിറവും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ഭാഗത്തും 30 സെ. മീ. വീതം നീളത്തിൽ ബോർഡോകഴമ്പു ചുറ്റോടച്ചുറും നന്നായി പുരട്ടുക (ചിത്രം 2).

3 കവരഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു തായ്ത്തണ്ടിനപകരം രണ്ടോ അതിലധികമോ തുല്യപ്രാധാന്യമുള്ള ശാഖകളോടെയുള്ള ചെടികളിൽ

കവരഭാഗത്തും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ശാഖകളിലേയും തവിട്ടുനിറവും പച്ചനിറവുമായി ചേരുന്നയിടങ്ങളിലും ബോർഡോകഴമ്പു മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പുരട്ടുക (ചിത്രം 3, 4).

4 തായ്ത്തണ്ടു വളവോടെ വളരുന്ന ചെടികളിൽ

തോട്ടത്തിന്റെ അതിരിൽ വന്ധരങ്ങൾ വളരുന്നതുമൂലം സൂര്യ പ്രകാശം തേടി എത്തിർവശത്തേക്കു വളഞ്ഞുവരുന്ന തൈകളിലും പോളിത്തീൻകൂട തൈകൾ നട്ട തോട്ടങ്ങളിലെ വളവോടെ വളരുന്ന തൈകളിലും മുകളിൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ കവരഭാഗത്തും മുകളിൽ തായ്ത്തണ്ടുകളിലും വേണ്ടതുപോലെ ബോർഡോകഴമ്പു പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞശേഷം വളഞ്ഞ തണ്ടിന്റെ പുറംവശത്തും (convex surface) കൂടുതലായി 30 സെ. മീ. നീളത്തിൽ താഴേയ്ക്കുകി കഴമ്പു പുരട്ടണം (ചിത്രം 5).

|| മനുവർഷം പ്രായമായ മരങ്ങളിൽ ബോർഡോ കഴമ്പു പുരട്ടൽ

മനുവർഷം പ്രായമായ ചെടികളിൽ ഒന്നാമത്തെ കവര മൊഴികെ മുകളിലുള്ള ഏല്ലാ പ്രധാനകവരങ്ങളിലും പ്രധാന ശിഖരങ്ങളിലെ തവിട്ടുനിറവും പച്ചനിറവും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലും മുകളിൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ ബോർഡോ കഴമ്പു പുരട്ടുക (ചിത്രം 5, 6, 7).

ബോർഡോ കഴമ്പു പുരട്ടാനായി ഓരോ ചെടിയിലും ഏണി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ കയറേണ്ടതില്ല. തറയിൽ നിന്നു കൊണ്ടുതന്നെ നീളമുള്ളപിടിയോടുകൂടിയ ബ്രഷ്സുപയോഗിച്ച് (ക്ലോയംപുശാൻപയോഗിക്കുന്നതരം) ബോർഡോകഴമ്പു പുരട്ടാം.

ബോർഡോകുഴമ്പു തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി

ഒരു കിലോഗ്രാം തുരിശ് അഞ്ചുലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക. രാത്രിയിൽ ഇഴയകലമുള്ള ഒരു തൂണിയിലോ ചാക്കിലോ തുരിശ് അയച്ചു കിഴിയായി കെട്ടിയശേഷം വെള്ളത്തിന്റെ നിരപ്പിൽ തൊടേവിധം തൂക്കിയിട്ടിരുന്നാൽ രാവിലെയാകുമ്പോഴേക്കും പൂർണ്ണമായും ലയിച്ചുകിട്ടും. പുതുതായി നീറ്റിയെടുത്ത ഒരു കിലോഗ്രാം കക്ക അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ചുനീറ്റി ചുണ്ണാമ്പാക്കി ശേഷിക്കുന്ന വെള്ളവും ചേർത്തു 5 ലിറ്ററാക്കി അരിച്ചെടുക്കുക. തുരിശിലായനി ചുണ്ണാമ്പുലായനിയിലേക്കു കറുക്കുകയായി ഒഴിച്ചു നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാം.

പശു ചേർക്കേണ്ട

പട്ടയുടെ പുറമെ പുരട്ടുന്ന ബോർഡോകുഴമ്പ് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഴപെയ്യുമ്പോൾ മഴവെള്ളവുമായുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ബോർഡോകുഴമ്പിലെ ചെമ്പുതന്മാത്രകൾ വേർതിരിഞ്ഞു മഴവെള്ളത്തിലൂടെ താഴെഞ്ചോലിച്ച് കഴമ്പുപുരട്ടിയ ഭാഗത്തിനു താഴെയുള്ള ചെടിയുടെ തൊലിപ്പുറം മുഴുവൻ ഒരാവരണമെന്നപോലെ വ്യാപിക്കുന്നു. തൊലിപ്പുറമെ വന്നുപറന്നു കുമിളിന്റെ രേണക്കൾ മുളയ്ക്കുന്നതോടെ അവ ഈ ചെമ്പു തന്മാത്രകളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം നശിച്ചുപോകുന്നു.

താഴെഞ്ചോലിച്ചിറങ്ങുന്ന കുഴമ്പിന്റെ അംശം ശ്വാസനരസ്യങ്ങളിലും ചെറുവീടുകളിലും പററിപിടിച്ചിരിക്കും. ഈ പ്രക്രിയ മഴക്കാലം മുഴുവൻ തുടരുകയും തൽഫലമായി കഴമ്പു പുരട്ടിയ ചെടികൾക്ക് ക്രമേണ പുരട്ടാത്തവയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഇരുണ്ട കറുപ്പു

നിറം കലർന്ന തവിട്ടനിറം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ചെടികളിൽ തൊലിപ്പുറമെ സാധാരണയായി വളരുന്ന ലൈക്കനുകൾ (Lichens)-കർഷകർ ഇതിനെ ചുണങ്ങെന്നു വിളിയ്ക്കും- വളരില്ല. ഈ പ്രക്രിയ ഇപ്രകാരം തടസ്സംകൂടാതെ നടന്നാൽ മാത്രമേ മരുന്നു പുരട്ടിയ മരങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രതിരോധശക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കുമിളിന്റെ രേണക്കൾ നനഞ്ഞ പുറംതൊലിയിൽ വന്നുപറ്റി കിളിർത്തു ശ്വാസനരസ്യങ്ങൾവഴി ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവയെ ഫലപ്രദമായി തടയണമെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം കുമിറുനാശിനിയുടെ അംശം ഒലിച്ചിറങ്ങി എത്തിയിരിക്കണം.

എന്നാൽ പശു കലർത്തിയ ബോർഡോ കഴമ്പാണുപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴമ്പിന്റെ അംശം താഴെപ്പറയുന്നതെ ബലമായി പിടിച്ചിനിറുത്തുകയും തന്മൂലം താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രതിരോധശക്തി ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. കഴമ്പുപുരട്ടിയ ഭാഗത്തിനു മാത്രമേ രോഗത്തിൽനിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കൂ.

അതുകൊണ്ട് പിക (ചീക്ക) രോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ ബോർഡോകുഴമ്പു പുരട്ടുമ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു പശയും ചേർക്കാൻ പാടില്ല.

പ്രതിരോധ ബോർഡോകുഴമ്പുപുരട്ടലിന് രണ്ടുവർഷം പ്രായമായ ചെടിയാണിത് 56 പൈസയും മൂന്നുവർഷം പ്രായമായതിന് ഒത്തുപ 68 പൈസയും വീതമേ ചിലവാകൂ.

പ്രതിരോധ കുഴമ്പുപുരട്ടൽ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ

- (1) തൊട്ടത്തിലെ എല്ലാ മരങ്ങളിലും മരുന്നുപുരട്ടണം.
- (2) മഴക്കാലത്തിനു തൊട്ടമുൻപായി റെന്തത്തവണമാത്രം മരുന്നു പുരട്ടിയാൽ മതി.
- (3) പുതിയതായി നീറിയ നല്ലയിനം കക്കയും തുരിശും കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർത്തു ബോർഡോകുഴമ്പ് തയ്യാറാക്കണം.
- (4) ബോർഡോ കുഴമ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ മരം, മണ്ണ്, ചെമ്പ്, ഷാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളേ ഉപയോഗിക്കാപൂ.
- (5) കാലവർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ മരുന്നു പുരട്ടിയിരിക്കണം.

- (6) മരത്തിന്റെ പുറംതൊലി ഉണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴെ മരുന്ന പുരട്ടാവൂ.
- (7) പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിൽകിട്ടി കഴമ്പു നന്നായി ഉണങ്ങിപററിപ്പിടിക്കണം.
- (8) കഴമ്പുപുരട്ടുന്നതിനു മുമ്പായി പുറംതൊലി ചുരണ്ടിക്കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
- (9) കഴമ്പിൽ പശ ഒന്നും ചേർക്കരുത്.
- (10) കഴമ്പുപുരട്ടൽ നീണ്ട പിടിയുള്ള ബ്രഷുപയോഗിച്ച് താഴെ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ നടത്താം.
- (11) മരുന്ന പുരട്ടിയ മരങ്ങൾ ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ രോഗം കണ്ടെത്താനായി പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല.
- (12) ക്ലോബർ- നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ഓരോ തവണ മാത്രം മരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഏതെങ്കിലും മരത്തിൽ രോഗം കണ്ടെത്തിയാൽ രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് യഥാവിധി ബോർഡോകഴമ്പുപയോഗിച്ച് രോഗനിയന്ത്രണചികിത്സ നടത്തേണ്ടതാണ്.

ഇതിനു ചിലനിവലപോലെ പുപ്പൽ മാത്രം ഉള്ളവയ്ക്ക് പുപ്പലിന്റെ പുറമെയും 30 സെ. മീ. മുക്തളിലേയ്ക്കും 30 സെ. മീ. താഴേയ്ക്കും ഉറപ്പിട്ടെ ചുറ്റോട്ടച്ചുറുമായി ബോർഡോകഴമ്പ് പുരട്ടണം. രോഗം മൂലം പട്ടയ്ക്കു കേടു സംഭവിച്ചവയ്ക്ക് ഒരുതവണ കഴമ്പ് രോഗബാധയുള്ളിടത്തു പുരട്ടിയശേഷം കേടുവന്ന പട്ടയും പുപ്പലും ചുരണ്ടിക്കളഞ്ഞ് മുക്തളിൽ പറഞ്ഞപോലെ വീണ്ടും കഴമ്പു പുരട്ടണം. ഉണങ്ങിയ ഗിഖരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ മുറിച്ചുമാറ്റി മുറിവാടിലും 30 സെ. മീ താഴെവരെയും കഴമ്പ് പുരട്ടണം.

പ്രതിരോധ മരുന്നപുരട്ടൽ രീതിയും രോഗമുണ്ടായതിനുശേഷം

കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള രീതിയും

തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യപഠനം


പ്രതിരോധമരുന്നപുരട്ടൽ

നിയന്ത്രണം

- | | |
|--|--|
| <p>(1) കാലവർഷത്തിനു തൊട്ടു മുൻപായി ഒരുവർഷം ഒരു തവണ മാത്രം മരുന്ന പുരട്ടിയാൽ മതി.</p> | <p>ഓരോ വർഷവും ജൂൺ മുതൽ നവംബർ വരെ കുറഞ്ഞത് 10 തവണയെങ്കിലും രോഗം പരിശോധിച്ചു മരുന്ന പുരട്ടിയിരിക്കണം. അതായത് തോട്ടത്തിലെ ഓരോ മരവും ആറുമാസത്തിനിടയിൽ 10 തവണയെങ്കിലും പരിശോധിച്ചിരിക്കണം. വൻകിട തോട്ടങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിനുള്ള മരങ്ങളാകുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിവരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും പണച്ചെലവും കൂടുതലാണ്. കൃഷിക്കാരന്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സന്ധ്യസംരക്ഷണ നടപടിയുമാണിത്. വലിയ തോട്ടങ്ങളിൽ തികച്ചും അപ്രായോഗികം.</p> |
| <p>(2) മരുന്നപുരട്ടൽ മഴയ്ക്കു മുമ്പായതുകൊണ്ട് മഴ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നില്ല.</p> | <p>മഴമാസങ്ങളിൽ ചെറുതെന്ന സംരക്ഷണനടപടിയായതുകൊണ്ട് മഴ തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു. ഏറ്റവും ദുർഗ്ഗതകരവും ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ കൂടുതലുമാണ്.</p> |
| <p>(3) നിലത്തു നിന്നുകൊണ്ടു ചെയ്യാമെന്നതുകൊണ്ട് താരതമ്യേന എളുപ്പമായ പണി.</p> | <p>മരത്തിലോ ഏണിയിലോ കയറേണ്ടതുകൊണ്ട് ശ്രമകരമായ സന്ധ്യ സംരക്ഷണ നടപടി.</p> |
| <p>(4) പ്രത്യേക പരിശീലനം ഇല്ലാതെ അനായാസം ചെയ്യാം.</p> | <p>തൂടക്കത്തിലേ രോഗം കണ്ടെത്തുക. വൈദഗ്ദ്ധ്യമാവശ്യമുള്ളതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ ജോലിയാണ്.</p> |

- (5) രോഗബാധ വളരെയേറെ കറവ്, നിസ്സാരം. രോഗബാധ വളരെ കൂടുതൽ. ഒരേ മരത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് രോഗാക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു. മുൻവർഷം രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതിനും പലപ്പോഴും പിറ്റേ വർഷവും രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു.
- (6) രണ്ടാം കൊല്ലവും മൂന്നാം കൊല്ലവും കൂടി ഒരു മരത്തിന് ആകെ ചിലവ് 2.24 രൂപ. രണ്ടു വർഷത്തെ മൊത്തം ചെലവ് 1.80 രൂപ.
- (7) മരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മരങ്ങൾ വേണ്ടവിധം വേഗം വളരുന്നു. രോഗബാധമൂലം ചെടികളുടെ ശീലാലങ്ങളും തായ്ത്തണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്ഷീണിക്കുന്നു. താമസിച്ച് വണ്ണമെത്തും. അപ്രായോഗികതമൂലം രോഗാക്രമണം കൊണ്ട് മരങ്ങൾ മുഴുവനായി നശിച്ചുപോകാം, സാരമായ കേടാകുക സംഭവിക്കാം. തന്മൂലം കൃഷിക്കാരന് വലിയ സാമ്പത്തികനഷ്ടം നേരിടുന്നു.
- (8) പികുരോഗ പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗം താരതമ്യേന വളരെയേറെ ഫലപ്രദവും ആയാസരഹിതവുമാണ്. പികുരോഗനിവാരണം മഴക്കാലമാസങ്ങൾ മുഴുവൻ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാർഷിക വൃത്തിയാകുന്നു. കൃഷിക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന.

“പികുരോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കൂ”
“റബർ മരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പു വരുത്തൂ”



P# 22



Edited and Published by the Dy. Director Publicity and
Public Relations Rubber Board, Kottayam
and Printed at Anaswara Printers, Kottayam-1.