

PH 14

റബ്ബറിന് വളപ്രയോഗം



റബ്ബർബോർഡ്

1. നഷ്ടനിവാരണ കൃഷിയുള്ള ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തേക്ക് രണ്ടര ടൺ കമ്പോസ്റ്റ് അഥവാ നന്നായി അഴുകിപ്പൊടിഞ്ഞ ചാണകം 400 കി.ഗ്രാം റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റുമായി ചേർത്തിളക്കിയ മിശ്രിതം അടിസ്ഥാനവളമായി ഉപയോഗിക്കാം.

മുൻകാലങ്ങളിൽ യാതൊരു കൃഷിയും ഇറക്കിയിട്ടില്ലാത്ത, പുതുതായി വെട്ടിത്തെളിച്ചെടുത്ത വനഭൂമിയിലാണ് നഷ്ടനിവാരണ കൃഷിയിലേക്ക് 400 കി.ഗ്രാം റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് മാത്രം അടിവളമായി ചേർത്താൽ മതിയാകും. ചാകണമോ കമ്പോസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ, ആദ്യവർഷം തയ്യാറാക്കിയ തടങ്ങളിൽത്തന്നെയാണ് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും തൈകൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ, മൂന്നു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം 'റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ്' അടിവളമായി ചേർത്താൽ മതിയാകും.

2. തൈകൾക്ക്, 6 മുതൽ 8 ആഴ്ചവരെ പ്രായമെത്തുമ്പോൾ 10:10:4:1.5 (എൻ.പി.കെ.എം.ജി.) മിശ്രിതം, നഷ്ടനിവാരണ കൃഷിയുള്ള ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തേക്ക് 2500 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. (നേരിവളങ്ങളുപയോഗിച്ച് 10:10:4:1.5 മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി പട്ടിക 4 ലും 5 ലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.)

3. ആദ്യ വളപ്രയോഗം നടത്തി 6-8 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ, നഷ്ടനിവാരണ കൃഷിയുള്ള ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തേക്ക് 550 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ യൂറിയ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം തൈകൾക്കു ചുവട്ടിൽ പുതയിടുന്നതും നല്ലതാണ്.

ഒട്ടുകമ്പു നഷ്ടനിവാരണ

പുഷ്പിയും ആരോഗ്യവുമുള്ള ഒട്ടുകമ്പ് (ബഡ്ഡിംഗ്) ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന അടിസ്ഥാനാവശ്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബഡ്ഡിംഗ് നഷ്ടനിവാരണ വളപ്രയോഗരീതികൾ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

1. നഷ്ടനിവാരണ കൃഷി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, നന്നായി പൊടിയാക്കിയ റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് നഷ്ടനിവാരണ കൃഷിയുള്ള ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തേക്ക് 165 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ അടിവളമായി ചേർക്കണം.

2. തടങ്ങളിൽ തൈകൾ നട്ട്, (തടങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുത്ത തൈകൾ അവിടെവെച്ചുതന്നെ ബഡ്ഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവ ബഡ്ഡിംഗ് ചെയ്ത് മുറിച്ചുവിട്ട്) 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വളപ്രയോഗവും തൈകൾക്ക് 8-9 മാസം പ്രായമാവുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വളപ്രയോഗവും നടത്താവുന്നതാണ്.

താണ്. 10:10:4:1.5 (എൻ.പി.കെ.എം.ജി) മിശ്രിതം, തൈ ഒന്നിന് 250 ഗ്രാം എന്ന തോതിലാണ് ഇതിനായി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പിന്നീടുള്ള ഓരോ വർഷവും ബഡ്ഡുകുന്ന് മുറിച്ചുവിട്ട് 2-3 മാസമാവുമ്പോൾ, തൈ ഒന്നിന് 125 ഗ്രാം വീതം 10:10:4:1.5 എൻ.പി.കെ.എം.ജി മിശ്രിതം നൽകാവുന്നതാണ്.

അപകൃകാലാവൃതം

തോട്ടങ്ങളിൽ നട റബ്ബർതൈകൾ വളർന്ന് ടാപ്പിങ്ങിനു പ്രായമാകുന്നതുവരെയുള്ള കാലാവൃതമാണ് അപകൃകാലാവൃതം. ചിട്ടയായ വളപ്രയോഗം ഈ കാലാവൃതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. തൈകൾ നടാൻ കൃഷി തയ്യാറാക്കി മുട്ടുമ്പോൾ ഓരോ കൃഷിയിലും 12 കിലോ ഗ്രാം കുമ്പോസ്റ്റ് (അല്ലെങ്കിൽ, നല്ലതുപോലെ അഴുകിപ്പൊടിഞ്ഞ ചാണകം), 200 ഗ്രാം റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇവ അടിവളമായി ചേർക്കണം. പുതുതായി കാടു വെട്ടിയെത്തിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേല്പറഞ്ഞ അളവിൽ റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. കൃഷി മുട്ടുമ്പോൾ ഈ വളങ്ങൾ, മുകളിലെത്തെ 20 സെ.മീ. മണ്ണുമായി നല്ലതുപോലെ കൂട്ടിക്കലർത്തുകയാണു വേണ്ടത്.

ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് സാധാരണമായി തൈകൾ നടുന്നത്. തുടർന്നുള്ള നാലു വർഷം തൈകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലാവൃതമായതിനാൽ ഈസമയത്ത് വളപ്രയോഗത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല മുതൽ എറണാകുളം ജില്ലവരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ നാലുവർഷം 10:10:4:1.5 എന്ന അനുപാതത്തിലുള്ള എൻ.പി.കെ.എം.ജി. വളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അതേസമയം തൃശ്ശൂർ മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള ജില്ലകളിലും കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലും 12:12:6 എന്ന അനുപാതത്തിലുള്ള എൻ.പി.കെ. വളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. (വളമിശ്രിതങ്ങളുടെ അളവുകളും ഉപയോഗക്രമവും 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള പട്ടികകളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.)

എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലേക്കുവേണ്ട ഫോസ്ഫറസിന്റെ പകുതിഭാഗം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ (water soluble) നൽകുന്നതാണ് ഉത്തമം. സ്ഥലഭേദമനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പകുതിഭാഗം ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 10:10(5):4:1.5 അഥവാ 12:12(6):6 എന്നീ വളങ്ങളാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കൂടത്തൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള വളപ്രയോഗം

* എൻ.പി.കെ.എം.ജി. 10:10(5):4:1.5 അല്ലെങ്കിൽ എൻ.പി.കെ. 12:12(6):6

പട്ടിക-1

വർഷം	തോട്ടത്തിൽ തൈ നടത്തിയ ശേഷമുള്ള കാലം	വളം ചേർക്കേണ്ട സമയം	എൻ.പി.കെ.എം.ജി. 10:10(5):4:1.5		എൻ.പി.കെ. 12:12(6):6	
			തൈ നന്നിന് (ഗ്രാം)	**ഹെക്ടർ പ്രതി (ക്വിഗ്രാം)	*തൈ നന്നിന് (ഗ്രാം)	**ഹെക്ടർ പ്രതി (ക്വിഗ്രാം)
ഒന്നാം വർഷം	3 മാസം	സെപ്റ്റം-ഒക്ടോ	450	200	380	170
രണ്ടാം വർഷം	9 മാസം	ഏപ്രിൽ-മെയ്	450	200	380	170
	15 മാസം	സെപ്റ്റം-ഒക്ടോ	450	200	380	170

* സ്ഥലമൊത്തുസരിച്ച് മാറുന്നു. ** ഹെക്ടർ പ്രതി 445 തൈകൾ എന്ന കണക്കിൽ.

കുറിപ്പ്: 1. കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആദ്യവർഷവളപ്രയോഗം രണ്ടുതവണയായി, കൂടത്തൈകൾ നടുന്നതോടൊപ്പമോ നട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകമോ 225 ഗ്രാമം (ആദ്യതവണ) നട്ട് 2-3 മാസത്തിനുശേഷം 225 ഗ്രാമം (രണ്ടാം തവണ) മേൽക്കണ്ണാമായി ഇളക്കിച്ചുർത്തുകൊടുക്കാം. 2. രണ്ട് തട്ട് ഇല എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കൂടത്തൈകളാണ് നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂറ്റി തൈകൾക്കുള്ള വളപ്രയോഗശുപാർശയാണ് അനുവർത്തിക്കേണ്ടത്.

കൂറ്റിതൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള വളപ്രയോഗം

* എൻ.പി.കെ.എം.ജി. 10:10(5):4:1.5 അല്ലെങ്കിൽ എൻ.പി.കെ. 12:12(6):6

പട്ടിക-2

വർഷം	തോട്ടത്തിൽ തൈ നടത്തിയ ശേഷമുള്ള കാലം	വളം ചേർക്കേണ്ട സമയം	എൻ.പി.കെ.എം.ജി. 10:10(5):4:1.5		എൻ.പി.കെ. 12:12(6):6	
			മരമൊന്നിന് (ഗ്രാം)	ഹെക്ടർപ്രതി (445 തൈകൾ) (ക്വിഗ്രാം)	മരമൊന്നിന് (ഗ്രാം)	ഹെക്ടർപ്രതി (445 തൈകൾ) (ക്വിഗ്രാം)
ഒന്നാം വർഷം	3 മാസം	സെപ്റ്റം-ഒക്ടോ	225	100	190	85
രണ്ടാം വർഷം	9 മാസം	ഏപ്രിൽ-മെയ്	450	200	380	170
	15 മാസം	സെപ്റ്റം-ഒക്ടോ	450	200	380	170

* സ്ഥലമൊത്തുസരിച്ച് മാറുന്നു.

കുറ്റിത്തെക്കളും കൂടത്തൈക്കളും ഉപയോഗിച്ചു കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളിലേക്ക് എൻ.പി.കെ.എം.ജി. 10:10(5):4:1.5 അല്ലെങ്കിൽ എൻ.പി.കെ. 12:12(6):6 പട്ടിക-3

വർഷം	തോട്ടത്തിൽ തൈ നട്ടതിനു ശേഷമുള്ള കാലം	വളം ചേർക്കേണ്ട സമയം	എൻ.പി.കെ.എം.ജി. 10:10(5):4:1.5	എൻ.പി.കെ. 12-12(6)-6
			മരമൊന്നിന് (ഗ്രാം) ഹെക്ടർപ്രതി (445 തൈകൾ)	മരമൊന്നിന് (ഗ്രാം) ഹെക്ടർപ്രതി (445 തൈകൾ)
മൂന്നാം വർഷം	21 മാസം	ഏപ്രിൽ-മെയ്	550	480
	27 മാസം	സെപ്റ്റം-ഒക്ടോ	550	480
നാലാം വർഷം	33 മാസം	ഏപ്രിൽ-മെയ്	450	380
	39 മാസം	സെപ്റ്റം-ഒക്ടോ	450	380

കുറിപ്പ്: ആവരണവിളകൾ നന്നായി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നാം വർഷത്തെ വരുപ്രയോഗത്യാർക്കു നാലാം വർഷവും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

അഞ്ചാം വർഷം മുതൽ

ആവരണവിള നന്നായി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, തൈകൾക്ക് ചവറുവയ്പു നടത്തിവരുന്നതുമായ തോട്ടങ്ങളിൽ അഞ്ചാംവർഷം മുതൽ വിളവെടുപ്പുവരെ 10:10:10 എന്ന അനുപാതത്തിലുള്ള എൻ.പി.കെ. മിശ്രിതം ഹെക്ടർ ഒന്നിന് 300 കിലോഗ്രാം രണ്ടു തുല്യ ഗവ്യക്കളായി നൽകണം. ഇതിനുപകരമായി 15:15:15, 17:17:17 എന്നീ കോംപ്ലക്സ് വളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 15:15:15, ഹെക്ടറൊന്നിന് 200 കിലോഗ്രാമും 17:17:17, 175 കിലോഗ്രാമും ചേർത്താൽ മതിയാകും.

ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ തൈകൾക്ക് ചവറുവയ്പ് നടത്താത്തതും ആവരണവിള ഇല്ലാത്തതുമായ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക്, അഞ്ചാം വർഷം മുതൽ വിളവെടുപ്പുവരെ 15:10:6 എന്ന അനുപാതത്തിലുള്ള എൻ.പി.കെ. മിശ്രിതമാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഹെക്ടർ പ്രതി 400 കിലോഗ്രാം, രണ്ടു തുല്യ തവണകളായി നൽകാവുന്നതാണ്.

ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരങ്ങൾക്ക്

ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരങ്ങൾക്ക് 10:10:10 എന്ന അനുപാതത്തിലുള്ള എൻ.പി.കെ. മിശ്രിതം ഹെക്ടറൊന്നിനു 300 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ചേർക്കണം. ഇതിനുപകരമായി 15:15:15 (200കി.ഗ്രാം), 17:17:17 (175 കി.ഗ്രാം) എന്നീ കോംപ്ലക്സ് വളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഒറ്റത്തവണയായോ ഏപ്രിൽ-മെയ്, സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ എന്നീ മാസങ്ങളിലായി വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണകളായോ വളം ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ വളങ്ങൾക്കു പകരമായി ഹെക്ടറൊന്നിന് 150 കിലോഗ്രാം ഫാക്ട്ഫോസ് (20:20) 50 കിലോഗ്രാം പൊട്ടാഷ്യമായി കലർത്തിയ മിശ്രിതമോ, 115 കിലോഗ്രാം എൻ.പി.കെ. 10-26-26 കോംപ്ലക്സ് വളം 40 കിലോഗ്രാം യൂറിയയുമായി ചേർത്ത മിശ്രിതമോ ഉപയോഗിക്കാം.

മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അഭാവംകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ (ഇലകളിൽ ഞരമ്പുകളുടെ ഇടയ്ക്കു മഞ്ഞനിറം) കാണപ്പെടുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ മേൽപറഞ്ഞ എൻ.പി.കെ. വളത്തിനുപുറമെ ഹെക്ടർ പ്രതി 50 കിലോഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റുകുടി നൽകണം. തോട്ടത്തിലെ മണ്ണും ഇലയും പരിശോധിച്ച്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളം ചെയ്യുന്നതാണ് കൃത്യതൽ അഭികാമ്യം.


മുനുവർഷത്തിനകം ആവർത്തനക്കുഷി നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ വളപ്രയോഗം തുടർന്ന് നടത്തുന്നത് ആദായകരമായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ വളപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കാം.

വളം ചേർക്കേണ്ടതെപ്പോൾ? എങ്ങനെ?

റബ്ബർതൈക്കൾക്ക് മൂന്നുമാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ വളപ്രയോഗം നടത്തേണ്ടത്. ചെടിക്കുചുറ്റും 30 സെ.മീ. വീതിയിൽ (ചെടിയിൽനിന്ന് 7 സെ.മീ. അകലത്തിൽ) വളം ഒരേ കുന്നത്തിൽ പരത്തിയിട്ടശേഷം ഒരു കൈപ്പല്ലികൊണ്ടിളക്കി മേൽമണ്ണു



ചിത്രം 1




ചിത്രം 2


മായി കൂട്ടിക്കലർത്തണം. തൈകൾക്കു ചവറുവയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളം മണ്ണുമായി ഇളക്കിപ്പൂർക്കുന്നതിനുപകരം വളത്തിനു മീതെ ചവറു നിരത്തിയാൽ മതിയാകും. എങ്ങനെയായാലും വളം ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ആറേഴു സെ.മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ താഴേക്കു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ, ചിത്രത്തിൽ (ചിത്രം 2-6) കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തൈകളുടെ ചുവട്ടിൽ വർഷംതോറും വീതികൂടിവരുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തത്തിലായിരിക്കണം വളം ചേർക്കേണ്ടത്. (ചെടിയിൽനിന്നുള്ള അകലവും കൂടിവരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.)


തൈകൾ നട്ട്, നാലോ അഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവയുടെ ഇലച്ചിൽ വളർന്ന് മൂടുന്നതുവരെ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ചുറ്റും വളം വിതറി ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നല്ലത്. അതിനുശേഷം നാലു മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിൽ വളം പരത്തിയിട്ടു കൊടുത്താൽ മതി. ഓരോ ഖണ്ഡവും നാലു മരങ്ങൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടും. കൃഷികൾ എടുത്തോ ആഴമുള്ള ചാലുകൾ കീറിയോ ഒരിക്കലും വളമിടരുത്. വളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന വേരുകൾ കൂടുതലും മേൽമണ്ണിലാകയാൽ മണ്ണിൽ ആഴത്തിലിടുന്ന വളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തൈകൾക്കു ലഭ്യമാകുകയില്ല.




ചിത്രം 3



ചിത്രം 4



27 മുതൽ 33 മാസം വരെ



39 മുതൽ 45 മാസം വരെ

ചിത്രം 1

ചിത്രം 6

വളപ്രയോഗത്തിന്റെ ശരിയായ ഫലം ലഭിക്കാൻ, വളം ചേർക്കുന്ന സമയവും രീതിയും തികച്ചും യോജിച്ചതായിരിക്കണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, കാലവർഷാരംഭത്തോടെ ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിലും തുലാവർഷത്തിനുമുമ്പ് സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലുമായി ആണ്ടിൽ രണ്ടുതവണയായി വളപ്രയോഗം നടത്താനാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാസവളങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ജൈവവളങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയാവശ്യമാണ്. വളമിടുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടത്ര ഹൂർപ്പും മണ്ണിലുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ ജലത്തിലൂടെ വളം ലഭിച്ചിറങ്ങി നഷ്ടപ്പെടാനും ഇടയാകരുത്.

റബ്ബർകൃഷിയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വളമിശ്രിതങ്ങളുടെ ചേരുവകൾ

1. എൻ.പി.കെ.എം.ജി. 10:10(5):4:1.5 വളമിശ്രിതത്തിന്റെ ചേരുവ 50% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് (സ്വപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്) ചേർന്നത്

പട്ടിക-4

നേർവളങ്ങൾ	അളവ് (കിഗ്രാം)	ലഭ്യമായ പോഷകഘടകങ്ങൾ			
		നൈട്രജൻ (N)	ഫോസ്ഫറസ് (P_2O_5)	പൊട്ടാസ്യം (K_2O)	മഗ്നീഷ്യം (MgO)
യൂറിയാ (46% N)	22	10	-	-	-
സ്വപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് (16% P_2O_5)	32	-	(5)	-	-
മെഗ്നേഷ്യം (18% P_2O_5)	28	-	5	-	-
മ്യൂറിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് (60% K_2O)	7	-	-	4	-
മാഗ്നീസിയം (40% MgO)	4	-	-	-	1.5
ഫിഗ്ഗർ	7				
ആകെ	100	10	10 (5)	4	1.5

2. എൻ.പി.കെ.എം.ജി. 10:10(5):4:1.5 വളമിശ്രിതത്തിന്റെ ചേരുവ
50% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് (അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് 20-20) ചേർന്നത്
പട്ടിക-5

തെളിപ്പിച്ചവ	അളവ് (കി.ഗ്രാം)	ലഭ്യമായ പോഷകഘടകങ്ങൾ			
		നൈട്രജൻ (N)	ഫോസ്ഫറസ് (P ₂ O ₅)	പൊട്ടാസ്യം (K ₂ O)	മഗ്നീഷ്യം (MgO)
യൂറിയാ (46% N)	11	5	-	-	-
അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് (20-20)	25	5	(5)	-	-
റാബ്ഫോസ് (18% P ₂ O ₅)	28	-	5	-	-
മ്യൂറിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് (60%)	7	-	-	4	-
മാഗ്നീഷ്യം (40% MgO)	4	-	-	-	1.5
ഫിബ്രിൽ	25	-	-	-	-
ആകെ	100.00	10	10 (5)	4	1.5

കുറിപ്പ്: മാഗ്നീഷ്യം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ പകരം 10 കി.ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.
(4 കി.ഗ്രാം മാഗ്നീഷ്യം പകരം 10 കി.ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്ന തോതിൽ). മഗ്നീഷ്യം
സൾഫേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും വ്യവസ്ഥാപനം
ഗവൺമെന്റുമാണ്.

3. എൻ.പി.കെ. 12:12(6):6 വളമിശ്രിതത്തിന്റെ ചേരുവ
50% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് (അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് 20-20) ചേർന്നത്
പട്ടിക-6

തെളിപ്പിച്ചവ	അളവ് (കി.ഗ്രാം)	പോഷകഘടകങ്ങൾ		
		നൈട്രജൻ (N)	ഫോസ്ഫറസ് (P ₂ O ₅)	പൊട്ടാസ്യം (K ₂ O)
യൂറിയാ (46% N)	13	6	-	-
അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് (20-20)	30	6	(6)	-
റാബ്ഫോസ് (18% P ₂ O ₅)	33	-	6	-
മ്യൂറിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് (60% K ₂ O)	10	-	-	6
ഫിബ്രിൽ	14	-	-	-
ആകെ	100	12	12 (6)	6

4. എൻ.പി.കെ.എം.ജി. 10:10:4:1.5 വളമിശ്രിതത്തിന്റെ ചോരുവ

പട്ടിക-7

നേർവളങ്ങൾ	അളവ് (കി.ഗ്രാം)	പോഷകഘടകങ്ങൾ			
		നൈട്രജൻ (N)	ഫോസ്ഫറസ് (P_2O_5)	പൊട്ടാസ്യം (K_2O)	മഗ്നീഷ്യം MgO
യൂറിയ (46% N)	22	10	-	-	-
താജ്ഫോസ് (18% P_2O_5)	55	-	10	-	-
മ്യൂറിയാറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് (60% K_2O)	7	-	-	4	-
മാഗ്നീഷ്യം (40% MgO)	4	-	-	-	1.5
ഫിഫ്ലർ	12	-	-	-	-
ആകെ	100	10	10	4	1.5

5. എൻ.പി.കെ. 12:12:6 വളമിശ്രിതത്തിന്റെ ചോരുവ

പട്ടിക-8

നേർവളങ്ങൾ	അളവ് (കി.ഗ്രാം)	പോഷകഘടകങ്ങൾ		
		നൈട്രജൻ (N)	ഫോസ്ഫറസ് (P_2O_5)	പൊട്ടാസ്യം (K_2O)
യൂറിയ (46% N)	26	12	-	-
താജ്ഫോസ് (18% P_2O_5)	64	-	12	-
മ്യൂറിയാറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് (60% K_2O)	10	-	-	6
ആകെ	100	12	12	6

6. എൻ.പി.കെ. 15:10:6 വളമിശ്രിതത്തിന്റെ ചേരുവ

5-ാം വർഷംതുടങ്ങി മാപ്പിൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ

പട്ടിക-9

ഘടകങ്ങൾ	അളവ് (കി.ഗ്രാം)	പോഷകഘടകങ്ങൾ		
		നൈട്രജൻ (N)	ഫോസ്ഫറസ് (P_2O_5)	പൊട്ടാസ്യം (K_2O)
യൂറിയ (46% N)	33	15	-	-
മാജ്ഫോസ് (18% P_2O_5)	55	-	10	-
മ്യൂറിയാറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് (60% K_2O)	10	-	-	6
ഫിബ്രി	2	-	-	-
ആകെ	100.0	15	10	6

7. എൻ.പി.കെ. 10:10:10 വളമിശ്രിതത്തിന്റെ ചേരുവ

5-ാം വർഷംതുടങ്ങി മാപ്പിൻ തുടങ്ങുന്ന കണക്കുകൾ

പട്ടിക-10

ഘടകങ്ങൾ	അളവ് (കി.ഗ്രാം)	പോഷകഘടകങ്ങൾ		
		നൈട്രജൻ (N)	ഫോസ്ഫറസ് (P_2O_5)	പൊട്ടാസ്യം (K_2O)
യൂറിയ (46% N)	22	10	-	-
മാജ്ഫോസ് (18% P_2O_5)	55	-	10	-
മ്യൂറിയാറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് (60% K_2O)	17	-	-	10
ഫിബ്രി	6	-	-	-
ആകെ	100	10	10	10

**ചില പ്രധാന രാസവളങ്ങൾ
പോഷകമൂലകങ്ങളുടെ ശതമാനം**

പട്ടിക-11

വളം	നൈട്രജൻ (N)	ഫോസ്ഫറസ് (P ₂ O ₅)	പൊട്ടാസ്യം (K ₂ O)	മഗ്നീഷ്യം MgO
1. അമോണിയം സൾഫേറ്റ്	20.6	-	-	-
2. യൂറിയ	46	-	-	-
3. മാഷ്ഫോസ്	-	18	-	-
4. മ്യൂറിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്	-	-	60	-
5. മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്	-	-	-	16
6. മാഗ്നസെറ്റ്	-	-	-	35-40
7. അമോഫോസ് (20-20)	20	20	-	-
8. സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്	-	16	-	-
9. ഡബിൾ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്	18	46	-	-

വിവേചനപുർവകമായ വളപ്രയോഗം

ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകമൂലകങ്ങളുടെ അളവിലും, അവ സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള മണ്ണിന്റെ കഴിവിലും വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളതിനാൽ തോട്ടത്തിലെ മണ്ണും ഇലയും പരിശോധിച്ച് വള പ്രയോഗം നടത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗ്ഗം. ചെടിക്കു ലഭ്യമാകാത്ത മൂലകങ്ങൾ അതിനാവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രം നൽകാനാവുന്നുവെന്നതാണ് രീതിയുടെ മെച്ചം.

പരിശോധനയ്ക്കായി, റബ്ബർതോട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് മണ്ണും ഇലയും ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശേഖരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകൾ തോട്ടത്തിനെ പൂർണ്ണമായി പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്നവ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. കൂടാതെ വളം ചേർത്തതിനുശേഷം രണ്ടുമൂന്നു മാസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുവേണം തോട്ടത്തിൽനിന്ന് മണ്ണും ഇലയും ശേഖരിക്കാൻ. സാധാരണയായി, മണ്ണിന്റെ സഭാവം, ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ്, വളപ്രയോഗരീതി, റബ്ബർമരങ്ങളുടെ പ്രായം, ആവരണവിളകളുടെയും റബ്ബർമരങ്ങളുടെയും വളർച്ച എന്നിവ, തോട്ടത്തിലെല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ 20 ഹെക്ടർ (ഏകദേശം 50 ഏക്കർ) വരെ വിസ്തൃതിയുള്ള തോട്ടങ്ങൾക്ക് മണ്ണിന്റെയും ഇലയുടെയും ഓരോ സാമ്പിൾ മതിയാകുന്ന


താണ്. എന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കേണ്ടിവരും. കൂടാതെ, ഒന്നിലധികം റബ്ബറിനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള തോട്ടമാണെങ്കിൽ ഓരോ ഇനത്തിനും ഇലയുടെ സാമ്പിൾ പ്രത്യേകം എടുക്കണം.

പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

തോട്ടത്തിലെ മണ്ണും ഇലയും ഒരേസമയം പരിശോധിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നവെങ്കിൽ ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർവരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് യോജിച്ച കാലം. എന്നാൽ മണ്ണു മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നവംബർ മുതൽ മാർച്ചുവരെയുള്ള കാലമാണ് അനുയോജ്യം.


മണ്ണ്

പരിശോധനയ്ക്കായി മണ്ണിന്റെ രണ്ടു സാമ്പിളുകളാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. മേൽമണ്ണിന്റെയും (30 സെ.മീ.വരെ ആഴത്തിലുള്ളത്) അടിമണ്ണിന്റെയും (30-60 സെ.മീ.വരെ ആഴത്തിലുള്ളത്) ഇതിനായി തോട്ടത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലായി 60 സെ.മീ. ആഴത്തിലുള്ള 5 മുതൽ 15 വരെ (വിസ്തൃതിയനുസരിച്ച്) കുഴികൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വളം ചേർത്തതു കൊണ്ട് മണ്ണിന്റെ വളക്കുറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യതിയാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായതിനാൽ മൂന്നു വളം ചേർത്ത സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് മണ്ണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത്.




പരിശോധനയ്ക്കായി മണ്ണു ശേഖരിക്കുന്ന രീതി

വിളവെടുപ്പാരംഭിച്ച മരങ്ങൾക്ക് നാലു മരങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടനികളിൽ വിതറിയോ ആണല്ലോ വളമിടുന്നത്. അതിനാൽ മണ്ണുശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കുഴികൾ സാധാരണയായി നാലു മരങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. വീട്, കന്നുകാലിത്തൊഴുത്ത്, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി എന്നിവയുടെ സമീപത്തുനിന്നും വെള്ളക്കെട്ടുള്ളതോ മരക്കുറ്റികൾ അവശേഷിക്കുന്നതോ ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും മണ്ണു ശേഖരിക്കരുത്. ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഇലകളും ദ്രവിക്കാത്ത മറ്റു ജൈവപദാർത്ഥങ്ങളും നീക്കിയശേഷം ഓരോ കുഴിയിൽനിന്നും മുകൾഭാഗം മുതൽ 30 സെ.മീ. വരെ ആഴത്തിൽ നേരെ താഴോട്ട് എന്താണ്ട് 8 മുതൽ 10 സെ.മീ. വീതിയിലും 2 മുതൽ 3 സെ.മീ.വരെ കനത്തിലും, ഉളിപോലുള്ള ഒരായുധംകൊണ്ട്



കുഴികളുടെ സ്ഥാനം

മണ്ണ് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. എല്ലാ കുഴികളിലേയും 30 സെ.മീ. വരെ ആഴത്തിലെടുത്ത സാമ്പിളുകൾ കുട്ടിക്കലർത്തുക. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ സാമ്പിളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കേണ്ടതായി വരും. ഇതിനായി കുട്ടിക്കലർത്തിയ മണ്ണ് ഒരു പോളിത്തീൻഷീറ്റിലോ കട്ടിയുള്ള കടലാസിലോ കനം കുറച്ചു സമചതുരാകൃതിയിൽ നിറത്തുക. അതിനുശേഷം ഈ സമചതുരത്തെ നാലു തുല്യവലിപ്പമുള്ള സമചതുരങ്ങളായി ഭാഗിക്കുക. കോണോടുകോണുള്ള രണ്ടു സമചതുരങ്ങളിലെ മണ്ണ്



കളഞ്ഞശേഷം ബാക്കിയുള്ള മണ്ണ് കുട്ടിക്കലർത്തി വീണ്ടും സമചതുരാകൃതിയിൽ നിറഞ്ഞി, കോണോടു കോണുള്ള ചതുരങ്ങളിലെ മണ്ണ് ഉപേക്ഷിക്കുക. ഈ രീതി അവശേഷിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ തൂക്കം ഏകദേശം 500 ഗ്രാം ആകുന്നതുവരെ തുടരുക.

30 മുതൽ 60 വരെ സെ.മീ. ആഴത്തിലുള്ള മണ്ണും (അടിമണ്ണ്) മേൽ വിവരിച്ച രീതിയിൽ ശേഖരിക്കേണ്ടതാണ്. മണ്ണ് ശേഖരിച്ച് തണലിൽ ഉണക്കിയശേഷം പ്രത്യേക സഞ്ചിയിലാക്കി മണ്ണിന്റെയും (മേൽമണ്ണ്/അടിമണ്ണ്) തോട്ടത്തിന്റെയും വിശദവിവരങ്ങൾ പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾപെൻ കൊണ്ടെഴുതിയ ഒരു ലേബൽ സഞ്ചിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഭദ്രമായി കെട്ടി, മണ്ണുപരിശോധനശാലയിലെത്തിക്കുക.

ഇല

പരിശോധനയ്ക്കായി ഇല ശേഖരിക്കുന്നത് സാധാരണമായി ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇലകൾക്ക് 6 മുതൽ 8 മാസം വരെ ചുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ട തോട്ടത്തിന്റെ വിസ്തൃതി അനുസരിച്ചു 10 മുതൽ 30 വരെ മരങ്ങൾ തോട്ടത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു (5 ഹെക്ടർ വരെ 10 മരങ്ങളും 20 ഹെക്ടർവരെ 30 മരങ്ങളും 5 മുതൽ 20 ഹെക്ടർ വരെ ആനുപാതികമായ തോതിലും മരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്).

ശാഖകളോടുകൂടിയ മരങ്ങളോ ടാപ്പുചെയ്യുന്ന മരങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ ഓരോ മരന്റെയും ചുവട്ടിൽ, തണലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വളരുന്ന പ്രധാന ശിഖരങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള തട്ടിലെ ചുവട്ടിലുള്ള നാല് ഇലകളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. തായ്ത്തടിയിൽനിന്നും പൊട്ടിക്കിളിർക്കുന്ന ചെറിയ ഒറ്റച്ചില്ലകളിലുള്ള ചുവട്ടിലെ നാല് ഇലകളും (spur leaves) അനുയോജ്യമാണ്. പുതിയ കിളിർപ്പോടുകൂടിയ ചില്ലകൾ, ഇലകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനു യോജ്യമല്ല. ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ വളം ചേർത്തതിനുശേഷമോ കാലവർഷാരംഭത്തോടുകൂടിയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലകൾ വേണ്ടത്ര ചുപ്പുത്തിയവയല്ലാത്തതിനാൽ അവയും സ്വീകാര്യമല്ല. പൊടിക്കുമ്പോൾ മുതലായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച ഇലകളും പരിശോധനയ്ക്ക് യോജിച്ചതല്ല. കൂടാതെ പട്ടമരപ്പ്, വേരുരോഗം ഇവ ബാധിച്ച മരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഇലകളും യോജിച്ചതല്ല. ശിഖരങ്ങളില്ലാത്ത തെ മരങ്ങളാണെങ്കിൽ, പുതിയ തളിരുകളില്ലാത്തവയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ടിന്റെ ചുവട്ടിലെ നാല് ഇലകളാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത്.

30 മരങ്ങളിൽനിന്നും ഇല ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഇലയും ഒരേയൊരു മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ദളം മാത്രവും, 15 മരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഇലകളാണെങ്കിൽ വശങ്ങളിലെ രണ്ടു ദളങ്ങൾ വീതവും, 10 മരങ്ങളാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദളങ്ങളും ശേഖരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഓരോ സാമ്പിളിലും ചുരുങ്ങിയത് 120 ദളങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇലകളെല്ലാം നിവർത്തി ന്യൂസ്പേപ്പർ ഷീറ്റുകൾക്കിടയിൽവച്ച് പായ്ക്കു ചെയ്യുക. പായ്ക്കിൽ തോട്ടത്തിന്റെ വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന ലേബൽ പതിക്കുക. സാമ്പിളുകൾ, ഡയറക്ടർ, റബ്ബർഗവേഷണകേന്ദ്രം, റബ്ബർബോർഡ് പി.ഒ., കോട്ടയം-9 എന്ന വിജാസത്തിലോ റബ്ബർബോർഡിന്റെ റീജിയണൽ ലാബറട്ടറികളിലോ കഴിയുന്നതും വേഗം എത്തിക്കുക.

റബ്ബർബോർഡ് റീജിയണൽ ലാബറട്ടറികൾ

1. ഇൗസ്റ്റ് ബാംഗ്ലാവ്,
നെടുമങ്ങാട്-695 541, ഫോൺ: 0472-2804660
2. പാർവതി മന്ദിരം,
കെ.പി. റോഡ്, അട്ടൂർ-691 523, ഫോൺ: 0473-4227168
3. ആന്റസ് ബിൽഡിങ്ങ്സ്,
ബൾഡ് ചർച്ച് ജങ്ഷൻ,
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി-686 507, ഫോൺ: 04828-203184
4. ടി.ബി. റോഡ്,
പാല-686 575
5. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജങ്ഷൻ,
മുവാറ്റുപുഴ-686 661, ഫോൺ: 0485-283699
6. പെരമാംഗലം പി.ഒ.,
തൃശ്ശൂർ-680 545, ഫോൺ: 0487-2216705
7. ഇൗസ്റ്റ് നടക്കാവ്,
കോഴിക്കോട്-673 011, ഫോൺ: 0495-2369610
8. റബ്ബർബോർഡ് റീജിയണൽ ആഫീസ്,
തളിപ്പറമ്പ്-670 141

ഇലയുടെ സാമ്പിളുകൾ കഴിയുന്നതും വേഗം (24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ) പരിശോധനശാലകളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണം. ഇതിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദളങ്ങൾ ചുടുള്ള ഇസ്മിതിപ്പെട്ടികൊണ്ട് തേച്ച് ഉണക്കി ന്യൂസ്പേപ്പറിനുള്ളിൽ വച്ച് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തിനകം എത്തിക്കണം. ഇലയുടെയും മണ്ണിന്റെയും സാമ്പിൾ അയക്കുന്നതോടൊപ്പം താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾകൂടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1. എസ്റ്റേറ്റിന്റെ/തോട്ടത്തിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും.
2. സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിന്റെ വിശദവിവരം (വിസ്തൃതി, നടീൽവർഷം എന്നിവ).
3. സാമ്പിൾ നമ്പർ.
4. മണ്ണ് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആഴം 0-30/30-60 സെ.മീ.
5. സാമ്പിൾ എടുത്ത തീയതി.
6. തോട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള നടീൽവസ്തുക്കൾ.
7. സാമ്പിൾ എടുത്ത സ്ഥലത്തെ മരങ്ങളുടെ ഇടയകലം.
8. മരങ്ങളുടെ ശരാശരി വണ്ണം (മ്ലോണൽമരങ്ങൾക്കു ചുവട്ടിൽനിന്നും 50 സെ.മീറ്ററും ബഡ്ഡുമരങ്ങൾക്ക് 125 സെ.മീറ്റർ ഉയരത്തിലും ഉള്ളത്.)
9. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നുള്ള ഉയരം.
10. വർഷപാതം (5 കൊല്ലത്തെ ശരാശരി—ഓരോ മാസത്തെയും).
11. ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ് (ചരിഞ്ഞതോ, നിരപ്പുള്ളതോ, തട്ടുകളായോ).
12. ആവരണവീളുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ.
13. തോട്ടത്തിലെ മൂൻകാല വിളകൾ.
14. വളപ്രയോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ (കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച വളമിശ്രിതം, ഓരോ മരങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹെക്ടറിനും ഉപയോഗിച്ച അളവ്, വളം മണ്ണിൽപ്പേർത്ത രീതി എന്നിവ).
15. വളം ചേർത്ത കാലം, ഏപ്രിൽ-മെയ്/സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ.
16. ശരാശരി ഉത്പാദനം (ഹെക്ടറിൽനിന്നും ആണ്ടിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം റബ്ബർ എന്ന്).

17. ടാപ്പിങ്ങിന്റെ കാരിന്റും (ഓരോ മരവും ആഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസം, പട്ടയുടെ മുഴുവൻ ചുറ്റളവിലോ പകുതിയിലോ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്).

18. രോഗാളത്തിലുള്ള മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളുടെയും വിളകളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ.

19. ഒരു ഹെക്ടറിൽ ഉള്ള റബ്ബർതൈകളുടെ/മരങ്ങളുടെ എണ്ണം.

20. മരുന്നുകളിൽ, ഗന്ധകപ്പൊടിയടിക്കൽ മുതലായവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

21. ഉത്തരജകൗഷധപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

22. ഇലപ്പടർപ്പിന്റെ സാന്ദ്രത (canopy density).

23. പ്രസക്തമായ മറ്റു വിവരങ്ങൾ.

സ്വപ്രദേശിന്റെ/ഉടമസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്
തീയതി:

പ്രാദേശിക മണ്ണുപരിശോധനശാലകളും സഞ്ചരിക്കുന്ന പരിശോധനശാലകളും

റബ്ബർത്തോട്ടങ്ങളിൽനിന്നും മണ്ണും ഇലയും ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളപ്രയോഗശുപാർശകൾ നൽകുന്നതിന് റബ്ബർബോർഡ് ഒട്ടേറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയത്തുള്ള, ഇന്ത്യൻ റബ്ബർഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലും നെടുമങ്ങാട്, അടൂർ, പാല, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, മുവാറ്റുപുഴ, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തളിപ്പറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള റീജിയണൽ ലാബറട്ടറികളിലും മണ്ണും ഇലയും പരിശോധിച്ച് വളപ്രയോഗശുപാർശകൾ നൽകാനുള്ള സൗകര്യം നിലവിലുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ, കോട്ടയം കേന്ദ്രമാക്കി രണ്ടും കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി ഒന്നും സഞ്ചരിക്കുന്ന മണ്ണുപരിശോധനശാലകൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

റബ്ബർബോർഡിന്റെ, സഞ്ചരിക്കുന്ന മണ്ണുപരിശോധനശാലകൾ ചെറുകിട റബ്ബർകർഷകകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്യാമ്പു ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ തോട്ടങ്ങളിലെ മണ്ണും ഇലയും പരിശോധിച്ച് വളപ്രയോഗത്തിനുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകുന്നു. കർഷകർ യഥാവിധി ശേഖരിച്ചു നൽകുന്ന സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ട വളത്തിന്റെ വിവരവും അളവും/തോതും നൽകുന്നു. ചെറുകിട കർഷകരുടെ തോട്ടങ്ങളിലെ മണ്ണും ഇലയും പരിശോധിക്കുന്നതിന് നാമമാത്രമായ ഫീസ് ഈടാക്കിവരുന്നു. മണ്ണുസാമ്പിൾ ഒന്നിന് 10 രൂപ വീതവും ഇല സാമ്പിൾ ഒന്നിന് 10 രൂപ ക്രമത്തിലുമാണ് ഫീസ് നൽകേണ്ടത്. (സർവീസ് ടാക്സ് പുറമെ)


വൻകിട കർഷകർ, (50 ഏക്കറിനു മുകളിൽ തോട്ടമുള്ളവർ) മണ്ണുസാമ്പിൾ ഒന്നിന് 50 രൂപയും ഇലസാമ്പിൾ ഒന്നിന് 100 രൂപയുമാണ് ഫീസായി നൽകേണ്ടത്. (സർവീസ് ടാക്സ് പുറമെ).

റബ്ബർബോർഡ് റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ

1. 3/33 സി, II ഫ്ളോർ, പി.പി.കെ. ബിൽഡിങ്, മെയിൻറോഡ്, മാർത്താണ്ഡം പി.ഒ., കന്യാകുമാരി. ഫോൺ: 04651-273949
2. കി.സി. 41/2490, തൈക്കാട് ഹൗസിന് എതിർവശം, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം. ഫോൺ: 0471-2327652
3. ശ്രീഭവൻ, XII/438, സൂര്യ സിനിഹൗസിനു സമീപം, നെടുമങ്ങാട്. ഫോൺ: 0472-2803270
4. രാജാ ട്രേഡ്സ്, കൃഷ്ണൻകോവിലിന് എതിർവശം, തൊളിക്കോട് പി.ഒ., പുന്നല്ലൂർ. ഫോൺ: 0475-2222616
5. തമകൻസ് ബിൽഡിങ്, II ഫ്ളോർ, പൂലമൺ പി.ഒ., കൊട്ടാരക്കര, ഫോൺ: 0474-2452763
6. II ഫ്ളോർ, എസ്.ജി. ബിൽഡിങ്, അടൂർ പി.ഒ. ഫോൺ: 04734-224370
7. ബിൽഡിങ് നമ്പർ PMC-XII/153 (3), മോളക് റോഡ്, ഹെഡ് പോസ്റ്റ്ഓഫീസിനു സമീപം, പത്തനംതിട്ട. ഫോൺ: 0468-2222370
8. മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിങ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി. ഫോൺ: 0481-2421532
9. മണിമലയാർ ബിൽഡിങ്സ്, വടവാതുർ പി.ഒ., കോട്ടയം. ഫോൺ: 0481-2573771
10. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ഫോൺ: 04828-202261
11. 8/330, കി.ബി. റോഡ്, പാല. ഫോൺ: 04822-216707
12. പാറനാമ്പി ആർക്കേഡ്, ഈരാറ്റുപേട്ട. ഫോൺ: 0482-2272507
13. ഇടുക്കി റോഡ്, തൊടുപുഴ. ഫോൺ: 0486-2222310
14. കെ.എസ്.ആർ.കി.സി. ബസ് സ്റ്റേഷനു സമീപം, മുവാറ്റുപുഴ. ഫോൺ: 0485-2832387
15. II ഫ്ളോർ, ക്ലാസ്സിക് ട്രേഡ്സ്, ജവഹർ തിയറ്ററിന് എതിർവശം, മുവാറ്റുപുഴ റോഡ്, കോതമംഗലം. ഫോൺ: 0485-2822055
16. II ഫ്ളോർ, അശ്വതി, ബിൽഡിങ് നമ്പർ 39/786 ബി.ഐ.യുത്തു ജങ്ഷൻ, ചിറ്റൂർ റോഡ്, എറണാകുളം. ഫോൺ: 0484-2380101
17. ബിൽഡിങ് നമ്പർ 27/222, കൃഷ്ണയ്യർ ലെയ്ൻ, ദിവാൻ നാരായണമേനോൻ റോഡ്, ചെമ്പുകാവ്, തൃശ്ശൂർ. ഫോൺ: 0487-2337991

18. ശോഭാ ടി എസ് എം കോംപ്ലക്സ്, II ഫ്ലോർ,
റയിൽവേസ്റ്റേഷൻ റോഡ്, പാലക്കാട്. ഫോൺ: 0491-2522802
19. ജാസ് ടവേഴ്സ്, കോടതിപ്പടി, മണ്ണാർക്കാട്. ഫോൺ: 04924-223087
20. പയനിയർ കോംപ്ലക്സ്, ജ്യോതി ജങ്ഷൻ,
നിലമ്പൂർ ഫോൺ: 04931-220290
21. പുളിക്കൽ ടവേഴ്സ്, കോർട്ട് റോഡ്,
പി.ബി. നമ്പർ 37, മഞ്ചേരി. ഫോൺ: 0483-2767026
22. മർഡിയൻ മൗണ്ട്സ് (മനോരമയ്ക്ക് സമീപം), പി.ബി. നമ്പർ 139,
വയനാട് റോഡ്, കോഴിക്കോട്. ഫോൺ: 0495-2768006
23. സമ സെന്റർ, മലബാർ ഹോസ്പിറ്റലിന് എതിർവശം,
ബുബിലി റോഡ്, തലശ്ശേരി. ഫോൺ: 0490-2321420
24. കോട്ടൂർ, ഗ്രീകൺറാപ്പറം. ഫോൺ: 0460-2230700
25. മറീന ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ്, നാഷണൽ ഹൈവേ,
തളിപ്പറമ്പ്. ഫോൺ: 0460-2203037
26. കാഞ്ഞങ്ങാട്. ഫോൺ: 0467-2203114
27. II ഫ്ലോർ, കുമാരവതി ബിൽഡിങ്, ബുൽമട്ട,
മംഗലാപുരം. ഫോൺ: 04824-2429229
28. എ.വി.എൻ. ബിൽഡിങ്,
പൂർണിമ തിയറ്ററിന് എതിർവശം, കൂന്ദാപുരം. ഫോൺ: 08254-231269

കത്തിടപാടുകൾ ഡെപ്യൂട്ടി റബ്ബർപ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മീഷണർ,
റബ്ബർബോർഡ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് എന്ന മേൽവിലാസത്തിലായിരിക്കണം.



൧൩ 14



റബർബോർഡ്

(പാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം, ഭാരതസർക്കാർ)

കോട്ടയം

പ്രസാധനം

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
പബ്ലിസിറ്റി & പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗം,
റബർബോർഡ്, കോട്ടയം - 686 002

ഫോൺ: 0461-2301231

ഇ-മെയിൽ : ppr@rubberboard.org.in

കോപ്പികൾ 10,000

ഏപ്രിൽ 2008

അച്ചടി: ഡി.സി. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം